

# Meditonsin®

## GOCCE

### Soluzione

Per l'uso nei neonati di età superiore ai 7 mesi, bambini e adulti

Principi attivi: Aconitina D5/ Atropina Solfato D5/ Cianato di Mercurio D8

**Leggere con attenzione tutto il foglietto illustrativo, prima di iniziare l'assunzione del medicinale in quanto contiene informazioni importanti.**

**Assumere questo medicinale sempre esattamente come descritto nel foglietto illustrativo o esattamente secondo le indicazioni del Suo medico o farmacista.**

- Conservare il foglietto illustrativo. Potrebbe aver bisogno di rileggerlo in seguito.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli si rivolga al farmacista.
- Se nota degli effetti collaterali si rivolga al Suo medico o farmacista. Questo vale anche per gli effetti collaterali non indicati in questo foglietto illustrativo. Vedi paragrafo 4.
- Se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura i sintomi peggiorano, si rivolga al Suo medico.

### Cos'è indicato in questo foglietto illustrativo:

1. Cosa sono Meditonsin® Gocce e quando utilizzarle?
2. Cosa deve tenere presente prima di assumere Meditonsin® Gocce?
3. Come assumere Meditonsin® Gocce?
4. Quali effetti collaterali può provocare?
5. Come conservare Meditonsin® Gocce?
6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

### 1. COS'È MEDITONSIN® GOCCE E QUANDO UTILIZZARLO?

Meditonsin® Gocce è un medicinale omeopatico per il trattamento delle malattie da raffreddamento.

#### Campo di applicazione

Il campo di applicazione risulta dalle indicazioni generali dei prodotti omeopatici. È indicato per il trattamento di infiammazioni acute della gola e del rino-faringe.

Se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura i sintomi peggiorano, si rivolga al Suo medico.

### 2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI ASSUMERE MEDITONSIN® GOCCE?

#### Non assumere Meditonsin® Gocce nei seguenti casi

- allergia ad Aconitina D5, Atropina Solfato D5, Cianato di Mercurio D8
- dipendenza da alcol (Meditonsin® Gocce contiene 6 Vol.-% Alcol).

#### Avvertenze e precauzioni d'uso

Consulti il Suo medico o farmacista prima di assumere Meditonsin® Gocce

Per l'uso di questo medicinale nei neonati di età inferiore ai 7 mesi non vi sono sufficienti esperienze documentate. Per tale motivo non somministrarlo a questo gruppo di pazienti. Somministrare Meditonsin® Gocce ai neonati fra i 7 e i 12 mesi solamente dopo aver consultato il medico.

Consultare il medico se i sintomi persistono, non sono chiari oppure se ci sono dei sintomi nuovi oltre a dispnea o febbre.

#### Se assume Meditonsin® Gocce con altri medicinali:

Se assume altri medicinali o li ha assunti da poco o intende assumerli informi il suo medico o farmacista.

Non si è a conoscenza di interazioni con altre sostanze.

#### Assunzione di Meditonsin® Gocce con alimenti, bevande analcoliche e alcoliche

L'efficacia dei medicinali omeopatici può essere influenzata negativamente da fattori generalmente dannosi nello stile di vita e da sostanze stimolanti e voluttuarie.

#### Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è incinta o sospetta di esserlo oppure sta pianificando una gravidanza o sta allattando consulti il Suo medico o farmacista prima dell'assunzione.

#### Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Meditonsin® Gocce non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

### 3. COME ASSUMERE MEDITONSIN® GOCCE?

Assumere questo medicinale sempre nel modo descritto nel presente foglietto illustrativo oppure secondo quanto stabilito insieme al Suo medico o farmacista. Se ha dei dubbi consulti il suo medico o farmacista.

Per gli adulti e i giovani di età superiore ai 12 anni vale quanto segue: Per il trattamento di sintomi acuti gli adulti e i giovani di età superiore ai 12 anni assumono ogni mezzora o ogni ora, al massimo 6 volte al di rispettivamente 5 gocce.

Per i neonati dal 7° mese di età fino al compimento di 1 anno vale quanto segue: dopo aver consultato il medico rispettivamente una goccia quattro volte al di. I bambini dopo aver compiuto il primo anno di età rispettivamente una goccia fino a 6 volte al di.

I bambini dai 6 ai 12 anni assumono fino a 6 volte al di da 1 a 2 gocce (al massimo 11 gocce al giorno),

#### Modalità d'uso

Si assumono le gocce diluite, tenerle in bocca per un po' prima di deglutire. Assumere indipendentemente dai pasti.

#### Durata della somministrazione

Iniziare ad assumere Meditonsin® Gocce possibilmente già ai primi sintomi.

Assumere per più di una settimana solamente previa consultazione con un medico o un terapeuta con esperienza nel campo dell'omeopatia. Consulti il medico o il farmacista se ha l'impressione che l'effetto di Meditonsin® Gocce sia troppo forte o troppo debole.

#### **Se ha assunto una dose superiore a quanto indicato di Meditonsin® Gocce**

In caso di iperdosaggio inavvertito del medicinale a causa degli ingredienti possono verificarsi nausea, vomito e diarrea. In questi casi consultare tempestivamente un medico.

#### **Se ha dimenticato di assumere Meditonsin® Gocce**

Non assuma la quantità doppia se ha dimenticato la dose precedente, ma continui ad assumere il medicinale come sopra indicato.

#### **Se interrompe l'assunzione di Meditonsin® Gocce**

Con molta probabilità si ripresenteranno i sintomi.

Se ha ulteriori domande sull'assunzione del medicinale si rivolga al suo medico o farmacista.

#### **4. QUALI EFFETTI COLLATERALI POTREBBERO VERIFICARSI?**

Come tutti i medicinali anche questo medicinale può avere degli effetti collaterali che però non devono necessariamente verificarsi in tutti.

##### **Possibili effetti collaterali**

Dopo l'uso di Meditonsin® Gocce può verificarsi una ipersecrezione salivare, in tal caso interrompere l'assunzione.

Possono verificarsi casi di ipersensibilità (p.e. prurito ed eruzioni cutanee), in tal caso interrompere l'assunzione del medicinale.

Avvertenza: l'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale). In tal caso interrompere l'assunzione e consultare il medico.

Informi per favore il suo medico o farmacista se uno degli effetti collaterali indicati dovessero nuocerle notevolmente o se osserva effetti collaterali che non sono indicati nel presente foglietto illustrativo.

##### **Comunicazione degli effetti collaterali**

Se nota degli effetti collaterali si rivolga al suo medico o farmacista. Questo vale anche per gli effetti collaterali non indicati in questo foglietto illustrativo.

Può comunicare gli effetti collaterali anche direttamente (vedi sotto). Comunicando gli effetti collaterali contribuisce a far sì che siano disponibili più informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
(Istituto Federale per Medicinali e prodotti medicinali)  
Abt. Pharmakovigilanz (reparto di farmacovigilanza)  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn

[www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html](http://www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html)

#### **5. COME CONSERVARE MEDITONSIN® GOCCE?**

Tenere i medicinali lontani dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicinale dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla scatola dopo "consumare entro il". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

##### **Condizioni di conservazione**

Questo medicinale non ha bisogno di essere conservato in condizioni particolari.

##### Periodo di validità dopo la prima apertura

Dopo l'apertura non usare Meditonsin® Gocce per più di 6 mesi e non conservare a temperature superiori a 25 °C.

Non smaltire questo medicinale nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltirlo quando non lo utilizza più. In questo modo contribuisce alla tutela dell'ambiente.

#### **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI**

##### **Cosa contiene Meditonsin® Gocce:**

I principi attivi sono:

10 g di soluzione (19 gocce/g) contengono:

Aconitina Dil. D5 (HAB, V. 5a) 1 g

Atropina Solfato Dil. D5 5 g

Cianato di Mercurio Dil. D8 4 g

Aconitina da D2, Atropina Solfato da D2 e Cianato di Mercurio da D4 rispettivamente potenziati con una miscela di etanolo 94% (G/G)/ glicerolo 85%/ acqua distillata (5:10:85)

##### **Aspetto di Meditonsin® Gocce e contenuto della confezione:**

Soluzione limpida, incolore

La confezione originale contiene 35 g/ 50 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) di soluzione

##### **Azienda farmaceutica e produttore**

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Telefono: 02371/937-0, Telefax: 02371/937-329, [www.medice.de](http://www.medice.de), e-mail: [info@medice.de](mailto:info@medice.de)

**Questo foglietto illustrativo è stato aggiornato febbraio 2016.**

Traduzione non ufficiale del foglietto illustrativo tedesco.

