

# Медитонзин® (Meditonsin®)

капли

Смесь

Для применения грудными детьми в возрасте старше 7 месяцев, детьми и взрослыми

Активные вещества: аконит (Aconitinum) D5/ атропина сульфат (Atropinum sulfuricum ) D5/ цианид ртути (Mercurius cyanatus) D8

**Перед началом приема данного лекарственного препарата внимательно прочитайте полностью листок-вкладыш, так как в нем содержится важная для Вас информация.**

**Принимайте лекарственный препарат точно по данной инструкции или по указанию своего врача, или фармацевта.**

- Сохраните листок-вкладыш. По всей вероятности Вы захотите перечитать его и позднее.
- Обратитесь к своему фармацевту, если Вам понадобится дополнительная информация или совет.
- Если Вы замечаете побочные действия, обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных действий, не перечисленных в данном листке-вкладыше (см. п. 4).
- Если через три дня не будет улучшения или начнется ухудшение Вашего состояния, то обратитесь к своему врачу.

**В данном листке-вкладыше содержится следующая информация:**

1. Что такое медитонзин® капли, и в каких случаях они применяются?
2. Что следует соблюдать до приема медитонзин® капель?
3. Как следует принимать медитонзин® капли?
4. Какие побочные действия могут наступить?
5. Как следует хранить медитонзин® капли?
6. Содержимое упаковки и прочая информация

## **1. ЧТО ТАКОЕ МЕДИТОНЗИН® КАПЛИ, И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ?**

Медитонзин® капли представляют собой гомеопатический лекарственный препарат, применяемый при простудных заболеваниях.

Области применения

Области применения лекарственного препарата определяются проявлениями действия гомеопатического лекарственного препарата. К ним относятся:

острые воспалительные заболевания полости горла, носа и глотки.

Если через три дня не будет улучшения или начнется ухудшение Вашего состояния, то обратитесь в своему врачу.

## **2. ЧТО СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ДО ПРИЕМА МЕДИТОНЗИН® КАПЕЛЬ?**

**Нельзя принимать медитонзин® капли в следующих случаях:**

- при аллергической реакции на вещества аконит (Aconitinum) D5, атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) D5 или цианид ртути (Mercurius cyanatus) D8;
- при заболевании алкоголизмом (медитонзин® капли содержат 6 объемных процентов спирта).

### **Предупреждения и меры предосторожности**

До приема медитонзин® капли обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Нет достаточно документированного опыта по применению данного лекарственного препарата для грудных детей в возрасте младше семи месяцев. Поэтому не рекомендуется применять его для пациентов данной возрастной группы. Принимать медитонзин® капли грудными детьми в возрасте от 7 до 12 месяцев следует только после консультации с врачом.

При длительных, неясных или вновь наступающих недомоганиях, а также при появлении одышки или при повышенной температуре рекомендуется обратиться к врачу.

### **При приеме медитонзин® капель вместе с другими лекарственными препаратами:**

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете/недавно принимали другие лекарственные препараты или собираетесь принимать другие лекарственные препараты.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.

### **Прием медитонзин® капель вместе с пищей, и напитками и алкоголем**

Общий нездоровый образ жизни и раздражающие или возбуждающие продукты могут отрицательно повлиять на действие гомеопатического средства.

### **Беременность, кормление грудью, репродуктивная способность и способность к рождению**

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, или Вы предполагаете беременность, или собираетесь забеременеть, то перед началом приема этого лекарственного препарата посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом.

### **Вождение транспортного средства и способность обслуживать машины**

Медитонзин® капли не оказывают никакого воздействия на способность к вождению транспортных средств или на способность к обслуживанию машин.

## **3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕДИТОНЗИН® КАПЛИ?**

Принимайте этот лекарственный препарат всегда точно в соответствии с инструкцией, содержащейся в этом листке-вкладыше, или по указанию своего врача или фармацевта. Если Вы не уверены, спросите своего врача или фармацевта.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: В случае острых состояний взрослые и подростки в возрасте старше 12 лет принимают каждые полчаса/час, однако, не более 6 раз в день, по 5 капель.

Грудные дети в возрасте от 7 месяцев и до одного года после консультации с врачом принимают по одной капле до 4 раз в день.

Дети в возрасте старше одного года принимают по одной капле до 6 раз в день.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1-2 капли до 6 раз в день (максимально 11 капель в день).

### **Способ применения**

Капли принимаются в неразбавленном виде, подержав их некоторое время во рту, перед проглатыванием. Прием лекарственного препарата проводится независимо от приема пищи.



#### Продолжительность приема

Рекомендуется начать принимать медитонзин® капли по возможности заблаговременно.

При приеме медитонзин® капли свыше одной недели желательнее проконсультироваться с врачом или опытным врачом-гомеопатом.

Если Вы считаете, что действие медитонзин® капли слишком сильное или слишком слабое, то, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

#### **Если Вы приняли большую дозу медитонзин® капли, чем это предписано**

Если Вы по ошибке приняли большую дозу лекарственного препарата, то в этом случае могут возникнуть тошнота, рвота и понос, что обусловлено ингредиентами препарата. В таких случаях немедленно обратитесь к врачу.

#### **Если Вы забыли принять медитонзин® капли**

Если Вы забыли принять лекарственный препарат, то не принимайте двойное количество, а продолжите лечение при употреблении рекомендованного количества капель.

#### **Если Вы прервали прием медитонзин® капли**

В этом случае симптомы могут снова появиться.

Если по приему лекарственного препарата возникнут дополнительные вопросы, обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или фармацевту.

#### **4. КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ НАСТУПИТЬ?**

Как и все лекарственные препараты, также и этот лекарственный препарат может вызвать побочные действия, которые, однако, необязательно наступают у каждого пациента.

#### **Возможные побочные действия**

После приема медитонзин® капли может возникнуть повышенное слюноотечение; в таких случаях прием лекарственного препарата должен быть прекращен.

Возможны реакции гиперчувствительности (например, зуд или сыпь). В этом случае следует прекратить прием лекарственного препарата.

Примечание: При приеме гомеопатических лекарственных препаратов имеющиеся симптомы в начальной стадии могут усилиться (первичное ухудшение). В таком случае Вы должны прекратить прием лекарства и посоветоваться со своим врачом.

Если одно из указанных побочных действий отрицательно воздействует на Ваше самочувствие или Вы замечаете побочные действия, не указанные в данном листке-вкладыше, то проинформируйте, пожалуйста, об этом своего врача или фармацевта.

#### **Сообщение о побочных действиях**

Если Вы замечаете побочные действия, то обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше.

Вы можете также сообщить о побочных действиях прямо в Федеральный институт лекарственных препаратов и медицинских продуктов (см. ниже). Тем самым Вы можете способствовать получению наиболее полной информации с целью более безопасного применения этого лекарственного препарата.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn

[www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html](http://www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html)

#### **5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ МЕДИТОНЗИН® КАПЛИ?**

Храните этот лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Нельзя применять этот лекарственный препарат после окончания срока годности, указанного на этикетке и на картонной коробке «Срок годности до:». Датой конечного срока годности считается последний день указанного месяца.

#### **Условия хранения**

Для данного лекарственного препарата не предусмотрены особые условия хранения.

#### **Срок хранения после вскрытия упаковки**

После вскрытия упаковки медитонзин® капли можно применять не более 6 месяцев и следует хранить при температуре не выше 25 °C.

Не выливайте лекарственный препарат в канализацию и не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Спросите у своего фармацевта, как правильно утилизировать не нужный Вам лекарственный препарат. Тем самым Вы вносите положительный вклад в защиту окружающей среды.

#### **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Что содержится в медитонзин® каплях:**

Активные вещества:

10 г смеси (19 капель/г) содержат:

аконит в гомеопатическом разбавлении D5 (Aconitinum Dil. D5) (HAB, V. 5a) 1 г  
атропина сульфат в гомеопатическом разбавлении D5 (Atropinum sulfuricum Dil. D5) 5 г  
цианид ртути в гомеопатическом разбавлении D8 (Mercurius cyanatus Dil. D8) 4 г

аконит (Aconitinum) с D2; атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) с D2 и цианид ртути (Mercurius cyanatus) с D4 потенцируются соответственно со смесью из 94-%-го этанола (G/G)/ глицерина 85%/ и очищенной воды (5:10:85)

##### **Внешний вид медитонзин® капель и содержимое упаковки:**

Прозрачная, бесцветная смесь

Фирменная упаковка содержит 35 г/ 50 г/ 70 г/ 100 г (2 x 50 г) смеси

##### **Фармацевтическое предприятие и изготовитель**

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, D-58638 Iserlohn (г. Изерлон), телефон: 02371/937-0, телефакс: 02371/937-329, [www.medice.de](http://www.medice.de), e-mail: [info@medice.de](mailto:info@medice.de)

**Данная Инструкция по применению последний раз была переработана в февраль 2016 года.**

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша.

